

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약의 구성성분 또는 첨가제에 과민반응 환자
- 2) 신장애 환자
- 3) 18세 미만인 자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

임부 또는 수유부에 대하여 지금까지 충분한 연구가 이루어지지 않아 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 수유부는 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 갑작스런 부종(부기), 피부 변색, 통증, 긴장감, 화끈감 등의 일반적이지 않은 증상이 한쪽 다리에서만 나타날 때에는 다리정맥 혈전(혈관막힘)증 같은 심각한 질환의 증후일 수 있으므로 즉시 의사와 상의할 것.

2) 심장 또는 신부전증이 나타날 경우 즉시 의사와 상의할 것.

3) 아래와 같은 이상사례가 발생할 경우, 특히 출혈, 피부 발진과 같은 증후가 보이면, 복용을 즉각 중지하고 의사와 상의할 것.

- 소화기계 : 구역, 구토, 설사, 복부불편
- 신경계 : 어지러움, 두통
- 과민반응 : 피부(가려움증, 발진), 심한 알레르기 반응(일부 경우에 출혈)
- 생식기관 및 유방질환 : 자궁출혈
- 심혈관계 : 빈맥, 고혈압

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 항응고제의 효과가 증폭될수 있으므로, 항응고제와 병용 투여시 혈액 응고 파라미터를 자주 모니터링 할 것.

2) 4주간 치료하여도 만족할 만한 증후개선이 없거나 부적절한 반응이 나타날 경우 부종(부기)이 다른 원인에 의한 것일 수 있으므로 의사와 상의할 것.

3) 이 약 복용 시 경증(가벼운 증상)의 위장관 장애가 나타나는 경우 식사와 함께 복용할 것.

4) 이 약의 과다복용 시, 주성분에 포함된 사포닌이 구역, 구토, 설사를 강화시킬 수 있음.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 25 °C 이하에서 보관할 것.

3) 수분으로부터 보호되도록 원래의 용기에 보관할 것.