

(정제)

○ 보통 성인 오픈록사신으로서 300~600 mg을 1일 2~3회 분할 복용한다.

○ 한센병의 경우에는 이 약으로서 400~600 mg을 1일 2~3회 분할 복용한다. 원칙적으로 다른 항한센병약과 병용한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(주사제)

오픈록사신은 적어도 60분에 걸쳐서 천천히 정맥주사한다. 근육주사, 피하주사, 늑막주사, 격막내 주사로는 사용하지 않는다.

1. 신기능이 정상인(크레아티닌 청소율이 분당 50 mL 이상) 보통 성인 : 이 약으로서 1회 200 mg, 1일 2회 투여하며 적응증 및 효과발현 정도에 따라 1회 400 mg, 1일 2회로 증량할 수 있다.

각각의 적응증별 투여량은 다음과 같다.

감염증	1회용량	투여간격	1일 용량
만성기관지염, 폐렴	200~400 mg	12시간	400~800 mg
피부 및 연조직의 감염	200~400 mg	12시간	400~800 mg
요로감염, 방광염	200 mg	12시간	400 mg
패혈증	200~400 mg	12시간	400~800 mg
귀의감염증	200~400 mg	12시간	400~800 mg

2. 신장애 환자 : 초회량은 보통 상용량을 투여 한 후 다음 용량부터 다음과 같이 조절한다.

1) 크레아티닌 청소율이 분당 20~50 mL : 보통 상용량을 24시간마다 1일 1회 투여한다.

2) 20 mL 미만 : 보통 상용량의 1/2을 24시간마다 1일 1회 투여한다.