

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람(신체 부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 코점막 부위

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약의 주성분과 보존제가 모두 중으로 분비되는지에 대하여 알려져 있지 않으므로 이 약을 사용하는 동안 수유하지 않거나 수유하는 동안 이 약을 사용하지 않는다.
- 2) 눈에 직접 닿으면 화끈감이 나타날 수 있으므로, 눈 주위에 사용할 경우 이 약이 눈에 직접 닿지 않도록 주의한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 매우 드물게 피부 화끈감 등의 과민반응
- 2) 이 약을 사용한 후 증상이 악화되거나, 일주일 이상 사용하여도 증상의 개선이 없는 경우

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 오·남용(잘못사용하거나 많이 사용)을 피하고, 품질을 보호#유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
- 3) 제품 개봉 후 3개월 이내에 사용할 것.