

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민반응 병력이 있는 환자
- 2) 중증(심한 증상)의 간 및 신기능 장애 환자
- 3) 중증(심한 증상)의 관상 심장 질환 환자
- 4) 잔뇨 형성을 수반하는 배뇨(소변을 눅)장애 환자
- 5) 고혈압 및 관상동맥(심장동맥)질환 환자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 2세 이하의 영아(갓난아기)
- 8) MAO 억제제를 투여중인 환자
- 9) 파라옥시안식향산메칠에 과민반응 환자(파라옥시안식향산메칠 함유제제에 한함)

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 혈압강하제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO 억제제, 교감신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네티딘, 브레틸리움, 베타나이드, 데브리소퀸, 메칠도파, 교감신경성약(총혈제거제, 식욕억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제(억제제)와 병용(함께 복용)투여하지 않는다.
- 2) MAO억제제의 긴 작용시간 때문에 MAO억제제 투여 최소 15일 후 이 약을 투여한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

이 약의 투여 중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의한다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 천식 환자
- 2) 녹내장 환자

3) 심질환 및 부정맥 환자

4) 당뇨병, 갑상샘기능항진증 환자

5) 전립샘비대로 인한 배뇨(소변을 눅)곤란 환자

6) 12세 미만의 소아

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 경우

2) 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한(땀이 남), 경미한(가벼운) 혈압강하, 시력장애, 산동(동공확대), 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직(굳음), 아테토시스, 간대상 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비 등의 중추신경계 이상이 나타날 경우

3) 피부반응, 일시적인 자극통, 작열감(화끈감) 등의 과민반응이 나타날 경우

4) 구갈, 구역, 구토 등의 소화기계 이상이 나타날 경우

5) 배뇨(소변을 눅)곤란 등의 이상이 나타날 경우

6) 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항.

과량투여 시 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용한다. 슈도에페드린 제거에는 투석하도록 한다.

7. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.