

사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 본인 또는 상대방이 이 약 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증인 경우
- 2) 적용 부위에 외상 또는 염증 환자
- 3) 상대방이 임신중인 경우

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 간·신질환 환자
- 2) 이 약은 프로필렌 글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오

3. 일반적 주의

- 1) 본인 또는 상대방에 발진 또는 자극이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 증상이 계속되는 경우에는 의사와 상담한다.
- 2) 의사의 감독을 받지 않고 3개월 이상 이 약을 사용하지 않는다.

4. 적용상의 주의

- 1) 외용으로만 사용하며 눈 또는 코에 사용하지 않는다.
- 2) 동일한 부위에 연속해서 3초 이상 분사하지 않는다.

5. 저장 및 취급상의 주의

- 1) 유·소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 40℃ 이상의 고온 또는 저온의 장소, 일광이 닿는 곳에 보관하지 않는다.
- 3) 사용후 불 속에 버리지 않는다.